

# 戴口罩和儿童护理

(2022年3月14日更新)

分层预防策略仍然是防范COVID-19的最佳方式。托儿所可以选择在他们的项目中要求戴口罩。托儿所工作人员和家庭也可以决定戴口罩。有执照的托儿所必须遵循早期学习部的[“托儿所COVID-19要求和建议”](#)。

早期学习部（ELD）和俄勒冈州卫生局（OHA）支持项目和家庭选择继续戴口罩。

在以下情况下，仍然建议戴口罩：

- 每位两岁及以上的儿童回到托儿所后，在为期五天的COVID-19[隔离](#)期后的五天内应戴上贴合好的口罩。
- 在[COVID-19社区传播水平](#)较高的时期，强烈建议室内普遍戴口罩。
- 在[COVID-19社区传播水平](#)中等的时期，建议患严重疾病风险较高的人或照顾有严重疾病风险的儿童的人戴上口罩。这些人包括那些：
  - 未接种疫苗或未[及时](#)接种疫苗的人。
  - 免疫功能低下的人。
  - 有残疾的人。
  - 正在与高危人群或未接种疫苗的人一起生活的人。
  - 有[基础病](#)的人。

帮助在托儿所项目中实施戴口罩指南的策略包括：

- 向工作人员、家庭成员和访客提供明确的书面政策。
- 对工作人员进行政策以及如何对家庭成员和访客进行政策教育的培训。
- 家庭参与工作，提高政策意识。
- 在入口处和整个托儿所有清晰的无障碍标志。
- 给没有口罩的工作人员、儿童和访客提供额外的口罩。
- 对投诉作出回应的明确书面协议。

关于COVID-19的资源和定期更新，请访问[OHA](#)。

额外资源：

- 俄勒冈州卫生局的[口罩要求和建议](#)
- 疾病预防控制中心（CDC）的“[何时戴口罩或呼吸器](#)”工具可以帮助提供者决定何时以及如何根据COVID-19在[县级级别](#)的社区传播情况实施分层方法。
- 早教部的 [COVID-19 资源](#)
- CDC中心对[托儿所项目的详细COVID-19指南](#)
- 进行[COVID-19检测](#)或[接种疫苗](#)
- 俄勒冈州卫生局的[“如果您测试呈阳性”帮助热线](#)

**文件可访问性：**对于残障人士或说英语以外的其他语言的人，OHA 可以提供其他格式的信息，例如翻译、大号字体或盲文。通过 1-971-673-2411, 711 TTY 或者 [COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us](mailto:COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us)，联系 COVID-19 通讯部门。